

MANEJO DEL LECHON DEL NACIMIENTO A LA CEBA

Medicina y Produccion de Cerdos (1er. lapso) 4to. Año de Ciencias Veterinarias

PREVIO AL PARTO

Bañar las cerdas con agua y jabón



Colocar las cerdas próximas a parir por grupos de partos semanales, colocando las cerdas primerizas y las de alta paridad en jaulas parideras contiguas para facilitar su manejo especial





PREVIO AL PARTO




Lavar las tetas de la madre con solución jabonosa - lodada

No meter la mano



- secado del lechón con papel absorbente
- limpieza de las fosas nasales, extracción del moco y resto de envolturas placentarias que cubren al lechón.
- desinfección del ombligo





- <u>Desinfectar el</u> <u>cordón</u>
- Seccionar el cordón a 5 cm.
- Sumergir el cordón húmedo en una solución antiséptica (tintura de yodo).

Secar los lechones

Poner un talco desinfectante en el suelo a fin de asegurar la higiene y cicatrización de la piel y del cordón umbilical.



Colocar los lechones al pezón de la madre para que consuman el calostro. (Primero los mas pequeños y luego los grandes)



Nivelación de las camadas.




 Redondear la punta de los colmillos para evitar las heridas en las mamas y las peleas entre lechones.



o 3er a 4 to.dia de edad

Aplicación del hierro, 2 ml. (200 mg), en el cuello (marca comercial de buena calidad)




Desinfectar las heridas de la castración con un producto no irritante y cicatrizante.

3er a 5to día de edad:


Castración







16 días de edad. suministro de la ración Fase 1



16 días de edad. suministro de la ración Fase 1

- Un lechón pesado al destete
- >6.5 kg a 21 d y > 7.8 kg a 28 d

Finalidad:

- Mejora la condicion fisica de la madre
 - Incrementa el peso al destete
 - •Facilitar el consumo pos destete



Ración Preiniciador (Precoz ó Fase 1)

Manejo
Alimenticio
de lechones
Pos destete




BATERIA, DESTETE, INICIACION O CRIANZA





- CLASIFICACION TAMAÑO
- REGISTROS/ CORRAL
- TD/TF
- NO MOJAR

Objetivos después del destete





No perder peso en la 1^a semana **Tener buen** consumo No tener diarreas **Mortalidad menor** del 4 % Buen peso a los 70 dias (30 kg)

PRECOZ 1 2

6.0 Kg 10 Kg


GD=350g
C=1,2









Manejo
Alimenticio
de lechones
en Iniciación



















Manejo
Alimenticio
de Cerdos
en Desarrollo











Manejo
Alimenticio
de Cerdos
en Engorde







17 Sem. + 3 sem. de lact. 20 sem.

CRECIMIENTO - ENGORDE

- o 30 Kg AL MATADERO
- o Uniformidad del lote
- LIMPIEZA Y DESINFECCION

GRACIAS.....

